

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж»

**Оценочные материалы
для промежуточной аттестации
по дисциплине
ОП.05 Фармакология**

31.02.01 Лечебное дело
срок обучения 3 года 10 месяцев
очная форма обучения

2026 г

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦМК
№ 1 от 31 .08.2026г.
Председатель ЦМК

Т.Л. Олейник

.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средства (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Фармакология по специальности 31.02.01 Лечебное дело, разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утверждённого приказом Минпросвещения России № 526 от 04.07.2022 года.

1.1. Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.05 Фармакология проводится в форме:
- комплексный экзамен;

1.2. Состав фонда оценочных средств

ФОС включает:

- тестовые задания, практические задания по переводу рецепта (Приложение 1)
- эталонные ответы (Приложение 2)

1.3. Проверяемые результаты

**Оценочные материалы
для промежуточной аттестации
по ОП.05 Фармакология**

1. Проверяемые результаты

№	Результаты (умения, знания)	Оценочное средство
	Умения:	
	Умеет выписывать лекарственные формы в рецептах с использованием справочной литературы	Задания практического характера.
	Уверенно и верно находит сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных.	В процессе текущего контроля.
	Демонстрирует умение ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств	Вопросы: 8,35,44,46,48,57,58,59, 61,62,66,67,69,71,87,117,118,119, 121,122,123,125,126,139,143,147, 148,151,152,154
	Выполняет практические задания, основанные на ситуациях, связанных с применением лекарственных средств по назначению врача	Вопросы: 2,3,5,6,7,10,14,15,24,34, 38,39,47,49,52,54,55, 56,60,72,79, 82,83,84,86,88,89,90,91,92,94,95, 96,97,100,101,103,104,106,107, 109,112,114,127,129,131,132,134, 135,138,140,141,144,145,158
	Демонстрирует умение давать рекомендации пациенту по применению лекарственных средств	Вопросы: 9,11,12,13,25,28,31,51, 108,110, 113,128,160,161,162
	Знания:	
	Демонстрирует знания лекарственных форм, путей введения лекарственных средств, видов их действия и взаимодействия	Вопросы: 17,36,75,77,81,98,111, 115,120,124,142,146,149,163,164

Демонстрирует знания основных лекарственных групп, фармакотерапевтического действия лекарств по группам	Вопросы: 4,16,18,21,26,29,33,37, 40, 41,42,43,50,53,63,64,65, 68,70, 78,116,136,137,150,153, 155,156
Демонстрирует знания побочных эффектов, видов реакций и осложнений лекарственной терапии	Вопросы: 1,19,20,22,23,27,30,32, 45,73,74,76,80,85,93,99,102,105, 130,133,157,159
Демонстрирует знания правил заполнения рецептурных бланков при написании рецепта	Задания практического характера.

2. Требования к условиям проведения

2.1. Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена необходимо:

1.Оборудование:

Персональный компьютер с выходом на платформу дистанционного обучения

2.Расходные материалы:

- Тестовые задания на бумажном носителе по дисциплинам комплексного экзамена
- Задания практического характера на бумажном носителе с эталонами ответов
- Бланки для ответов со штампом -по количеству обучающихся

3.Информационное обеспечение:

- Открытый доступ к личному кабинету на платформе дистанционного обучения
- Логины и пароли на каждого обучающегося (с указанием ФИО) на каждую дисциплину (4 списка)

2.2 Промежуточная аттестация проводится в 2 этапа.

I этап: учет результатов текущего контроля.

Обучающемуся выставляется средний балл на основании результатов текущего контроля, после чего он переходит ко II этапу. В случае наличия незакрытых неудовлетворительных оценок или пропусков (независимо от их причин), обучающийся имеет возможность устранить неудовлетворительные оценки и пропуски только по теоретическим занятиям в письменной форме (письменный ответ, тестовое задание, решение ситуационной задачи и т.п.) в течение времени, отведенного для промежуточной аттестации.

Студенту, выдается проштампованный лист, на котором он пишет дату, свою фамилию и инициалы. Обучающийся обязан продемонстрировать знание материала по предмету, дисциплине.

Если студент изложил весь материал на оценку не ниже «удовлетворительно», то преподаватель вносит эту оценку(оценки) в журнал учета успеваемости и подсчитывает средний балл, выставляет его в ведомость, допускает обучающегося до 2 этапа.

Если студент не успел/не смог верно изложить часть материала, то оценки выставляются только за оцененные не ниже «удовлетворительно» ответы. В этом случае он не допускается до 2 этапа промежуточной аттестации и считается имеющим академическую задолженность.

3. Критерии оценивания и порядок выставления итоговой отметки

Критерии оценивания тестового задания по ОП.05 Фармакология

Отметка	Условия
5 (отлично)	100-95% правильных ответов

4 (хорошо)	94-85% правильных ответов
3 (удовлетворительно)	84-70% правильных ответов
2 (неудовлетворительно)	69% и менее правильных ответов

Критерии оценивания практического задания по ОП. 05 Фармакология

Правильное выполнение каждого из заданий части В оценивается 2 баллами. Выставляется 0,5 балла, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том числе есть один лекарство написано правильно (название, окончание); выставляется 0,5 балла, если указана форма выпуска; выставляется 0,5 балла, если указана дозировка, количество, %, объем; выставляется 0,5 балла, если правильно прописана сигнатура; во всех других случаях выставляется 0 баллов (максимально 10 баллов).

Отметка	Условия
5 (отлично)	10-9 баллов
4(хорошо)	8-7 баллов
3(удовлетворительно)	6 баллов
2(неудовлетворительно)	5 и менее баллов

Итоговой отметкой является среднее значение баллов, полученных за выполненные задания части А и В. При получении баллов с цифрой после запятой, баллы округляются до целого числа в большую сторону.

**Тестовые задания для промежуточной аттестации
по ОП. 05 Фармакология
(Комплексный экзамен)**

1. ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а. гипертензия
- б. брадикардия
- в. кашель
- г. диарея

2. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НАЗНАЧАЮТ

- а. преднизолон
- б. фуросемид
- в. промедол
- г. клонидин (клофелин)

3. ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ:

- а. эпинефрина (адреналин)
- б. нитроглицерина
- в. кальция хлорида
- г. атропина сульфата

4. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ, ОСЛОЖНЕННЫМ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ:

- а. каптоприл
- б. пропранолол
- в. эналаприлат
- г. нитраты

5. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ:

- а. 5% раствора декстрозы (глюкозы)
- б. 6% раствора рефортана
- в. 40% раствора декстрозы (глюкозы)
- г. 0,9% раствора натрия хлорида

6. В КАЧЕСТВЕ ПЕНОГАСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

- а. этиловый спирт 33%
- б. нашатырный спирт
- в. перекись водорода 3%
- г. метиловый спирт

7. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ:

- а. атропина сульфат
- б. норэпинефрин (норадреналин)
- в. допамин
- г. эпинефрин (адреналин)

8. В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- а. противовирусные
- б. гепатопротекторы
- в. ферментные
- г. антибиотики

9. СТЕНОКАРДИЧЕСКИЕ БОЛИ КУПИРУЮТСЯ

- а. корвалолом
- б. нитроглицерином
- в. валидолом
- г. аспирином

10. ОПТИМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. ингаляционное введение глюкокортикоида
- б. внутривенное введение адреналина
- в. внутривенное введение эуфиллина
- г. ингаляция кислорода

11. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ ПРИНИМАЯ

- а. ранитидин
- б. омез
- в. де-нол
- г. вентер

12. ПРЕПАРАТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- а. коринфар
- б. нитроглицерин
- в. анаприлин
- г. аспирин

13. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДАГНОСТИКИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ И КРИЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ПРИМЕНЯЮТ

- а. верапамил
- б. тропafen
- в. капотен
- г. магния сульфат

14. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ОТ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ БЕТА-АДРЕНОМИМЕТИКОВ ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ СЛЕДУЕТ ПРИСТУПИТЬ К ВНУТРИВЕННОМУ ВВЕДЕНИЮ

- а. папаверина
- б. но-шпы
- в. преднизолона
- г. супрастина

15. ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- а. карбенициллин
- б. трихопол
- в. пирантел
- г. тавегил

16. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-И ПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИМЕНЯЮТ

- а. омепразол
- б. мелоксикам
- в. лоперамид
- г. метамизол

17. АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. налоксон
- б. атропина сульфат
- в. унитиол
- г. этиловый спирт

18. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ОКСИТОЦИНА СЛУЖИТ

- а. слабость родовой деятельности
- б. угроза преждевременных родов
- в. нарушение менструального цикла
- г. недоразвитие половых признаков

19. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ОБЫЧНЫХ ДОЗАХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

- а. стероидного диабета
- б. кандидоза ротоглотки
- в. язвы желудочно-кишечного тракта
- г. синдрома Иценко-Кушинга

20. ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ УХУДШАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

- а. ингибиторы АПФ
- б. глюкокортикостероиды
- в. антагонисты кальция
- г. оральные контрацептивы

21. АНАПРИЛИН НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

- а. похудания
- б. бессонницы
- в. тахикардии
- г. экзофтальма

22. ПРИЕМ НИТРОПРЕПАРАТОВ МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ

- а. головной болью
- б. тошнотой
- в. потливостью
- г. поносом

23. ПРИ КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ ДИГОКСИН, ПРОВОДЯТ

- а. рентгенографию легких
- б. ЭКГ
- в. общий анализ мочи
- г. общий анализ крови

24. КОНТРОЛЬ БОЛИ ПОСЛЕ СУБЛИНГВАЛЬНОГО ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- а. 10 минут
- б. 5 минут
- в. 8 минут
- г. 7 минут

25. ПРИ СОХРАНЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИЕМА НИТРОКОРА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПРИМЕНЯЮТ

- а. нитрокор повторно
- б. корвалол
- в. анальгин
- г. феназепам

26. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАХИКАРДИИ, ВЫЗВАННОЙ НИТРОГЛИЦЕРИНОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- а. пропранолол
- б. эналаприл

- в. корвалол
- г. но-шпа

27. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. повышение артериального давления
- б. отеки на ногах
- в. головная боль
- г. сухой кашель

28. ПОВТОРНУЮ ДОЗУ НИТРОПРЕПАРАТА ПРИ СУБЛИНГВАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОЖНО ПРИНЯТЬ ЧЕРЕЗ _____ МИНУТ

- а. 10
- б. 2
- в. 1
- г. 5

29. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРИ ИБС СПОСОБСТВУЮТ

- а. снижению потребности миокарда в кислороде
- б. расширению коронарных сосудов
- в. увеличению потребности в кислороде
- г. спазму периферических сосудов

30. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТЕРАПИИ НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. желудочно-кишечное кровотечение
- б. повышение температуры тела
- в. брадикардия
- г. снижение артериального давления

31. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ДИАРЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- а. лоперамид
- б. невигамон
- в. ампициллин
- г. дротаверин

32. РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ВОЗМОЖНО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ

- а. бета-адреноблокаторов
- б. нитратов
- в. ингибиторов АПФ
- г. антагонистов кальция

33. ПРЕПАРАТ, ПОВЫШАЮЩИЙ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ

- а. викасол
- б. питуитрин
- в. фибринолизин
- г. адреналин

34. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. беродуал
- б. но-шпа
- в. папаверин
- г. нитроминт

35. ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА

- а. психостимуляторы

- б. нейролептики
- в. анксиолитики
- г. антидепрессанты

36. ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В КОНЦЕНТРАЦИИ %

- а. 3
- б. 6
- в. 20
- г. 10

37. ДЛЯ СНЯТИЯ ПРИСТУПА ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ

- а. лазикс
- б. димедрол
- в. но-шпу
- г. дибазол

38. КУПИРОВАНИЕ ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ВКЛЮЧАЕТ

- а. ингаляция бронхолитического препарата
- б. гипотензивный препарат
- в. нитроглицерин под язык
- г. горчичники на затылочную область

39. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМА НЕОБХОДИМО НАЗНАЧАТЬ ПРЕПАРАТЫ

- а. калия
- б. стронция
- в. магния
- г. кальция

40. ЛЕЧЕНИЕ ТИРЕОТОКСИКОЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

- а. инсулина
- б. преднизолона
- в. L-тироксина
- г. мерказолила

41. ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАРЕЗОМ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ

- а. антигистаминные
- б. слабительные
- в. прозерин
- г. спазмолитики

42. ПРИ ГУСТОЙ ВЯЗКОЙ МОКРОТЕ РЕКОМЕНДУЮТ

- а. тусупрекс
- б. амбробене
- в. либексин
- г. кодеин

43. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ I ТИПА СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ

- а. сульфаниламидными препаратами
- б. инсулином на фоне диетотерапии
- в. акарбозой
- г. ограничением углеводов

44. ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФАРМАКОТЕПИИ СОЦИАЛЬНЫХ ФОБИЙ

- а. антидепрессанты
- б. нейролептики

- в. психостимуляторы
- г. ноотропы

45. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ВИТАМИНА Д ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕМ

- а. витаминов А и Е
- б. смекты
- в. витаминов В и С
- г. фенobarбитала

46. ПРИ ГИПЕКИНЕТИЧЕСКОМ ТИПЕ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ДЛЯ КУПИРОВАНИИ БОЛИ ЭФФЕКТИВНЫ

- а. спазмолитики
- б. сульфаниламиды
- в. нитрофураны
- г. антибиотики

47. ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ

- а. аминогликозидов
- б. макролидов
- в. цефалоспоринов
- г. пенициллинов

48. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

- а. антибиотики
- б. нитрофураны
- в. гепатопротекторы
- г. антигистаминные

49. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЮТ

- а. ампициллин, фурадонин
- б. преднизолон, циклофосфан
- в. димедрол, баралгин
- г. изониазид, рифампицин

50. ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ОТХАРКИВАЮЩУЮ МИКСТУРУ, СОДЕРЖАЩУЮ ВЫТЯЖКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- а. термопсиса
- б. пустырника
- в. валерианы
- г. толокнянки

51. ОСНОВНОЙ ЖАРОПНИЖАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГИПЕРТЕРМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

- а. анальгин
- б. парацетамол
- в. пипольфен
- г. баралгин

52. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИНГАЛЯЦИЮ

- а. беродуала
- б. 2% содового раствора (щелочную)
- в. увлажненного кислорода
- г. гидрокортизона

53. В СЛУЧАЕ ВЫРАЖЕННОГО УГНЕТЕНИЯ ДЫХАНИЯ ОТ ВВЕДЕНИЯ МОРФИНА ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- а. налоксона
- б. адреналина
- в. кордиамина
- г. бемегрида

54. В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- а. анальгин
- б. лазикс
- в. дибазол
- г. амоксициллин

55. ПРИ КАШЛЕ С ГНОЙНОЙ МОКРОТОЙ ПРОТИВОПОКАЗАН

- а. амбробене
- б. бромгексин
- в. мукалтин
- г. кодеин

56. ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- а. магния сульфат
- б. натрия оксибутират
- в. диазепам
- г. феназепам

57. ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С СОХРАНЕННОЙ СЕКРЕЦИЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- а. альмагель, ранитидин
- б. баралгин, аллохол
- в. левомицетин, колибактерин
- г. плантаглюцид, фестал

58. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

- а. бронхолитики, диуретики
- б. антибиотики, отхаркивающие
- в. бронхолитики, глюкокортикоиды
- г. антибиотики, диуретики

59. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО БРОНХИТА ПРИМЕНЯЮТ

- а. пентамин, дигоксин
- б. теофедрин, фуросемид
- в. преднизолон, эуфиллин
- г. кларитромицин, бромгексин

60. ПРИ РАЗВИТИИ ЧАСТОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ У ПАЦЕНТА С ИНФАРКТМ МИОКАРДА ПРИСТУПАЮТ К ВВЕДЕНИЮ

- а. лидокаина
- б. кордарона
- в. новокаинамида
- г. адреналина

61. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИМЕНЯЮТ

- а. панангин, аспаркам
- б. эналаприл, амлодипин
- в. супрастин, преднизолон

- г. кордарон, корвалол

62. ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

- а. но-шпа, баралгин
- б. мезатон, лазикс
- в. гепарин, димедрол
- г. кордиамин, валидол

63. ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ АНТИХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

- а. де-нол
- б. ранитидин
- в. гастрोцепин
- г. атропин

64. ОТХАРКИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

- а. мукалтин
- б. эуфиллин
- в. тавегил
- г. либексин

65. ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КИШЕЧНИКА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТ

- а. церукал
- б. атропин
- в. прозерин
- г. гипертоническую клизму

66. КУПИРОВАНИЕ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. ненаркотических анальгетиков
- б. наркотических анальгетиков
- в. спазмолитиков
- г. транквилизаторов

67. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ

- а. супрастин, преднизолон
- б. энтерол, креон
- в. нитроглицерин, гепарин
- г. левофлоксацин, цефтриаксон

68. ПРИ ПРИСТУПЕ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ

- а. димедрол
- б. дибазол
- в. лазикс
- г. но-шпу

69. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

- а. глюкокортикостероиды, цитостатики
- б. бронхолитики, муколитики
- в. антибиотики, нитрофураны
- г. ингибиторы АПФ, диуретики

70. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ГЕПАРИНА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- а. общий анализ крови
- б. глюкоза крови
- в. коагулограмма

- г. общий холестерин

71. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

- а. лозартан
- б. моксонидин
- в. эналаприл
- г. амлодипин

72. ТЕРМИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРОВОДИТСЯ

- а. орошением
- б. через дыхательные пути
- в. внутривенно
- г. эндолюмбально

73. ГЛАУКОМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- а. атропин
- б. де-нол
- в. альмагель
- г. но-шпа

74. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АТРОПИНА ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- а. выраженный болевой синдром
- б. головная боль
- в. гипотония мочевого пузыря
- г. диарея

75. ПРИ КОНТАКТНОМ ПОРАЖЕНИИ МАРГАНЦОВОЙ АНТИДОТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. перекись водорода
- б. унитиол
- в. аскорбиновая кислота
- г. натрия тиосульфат

76. ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ КЛОФЕЛИНОМ ХАРАКТЕРНО

- а. брадикардия, гипотония, рвота, возбуждение
- б. тахикардия, рвота, возбуждение
- в. брадикардия, гипотония, сонливость
- г. тахикардия, гипотония, рвота

77. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОНОВ ПОКАЗАНО

- а. для профилактики инфекционных заболеваний
- б. для ускорения выведения радиоактивных веществ и солей тяжелых металлов из организма
- в. с целью повышения иммунитета
- г. при угрозе отравления сильнодействующими ядовитыми веществами

78. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- а. транквилизаторы
- б. глюкокортикоиды
- в. седативные средства
- г. антигистаминные средства

79. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ОТЕКОМ ЛЕГКИХ, ВКЛЮЧАЕТ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ

- а. фуросемида
- б. магния сульфата
- в. дибазола
- г. дроперидола

80. УХУДШЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ВОЗМОЖНО ОТ

- а. повторного назначения симпатомиметиков
- б. введения гормонов
- в. повторного введения гормонов
- г. введения атропина

81. ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ВНУТРИВЕННАЯ ИНФУЗИЯ НИТРОПРЕПАРАТОВ СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ

- а. одышки
- б. сердцебиения
- в. рецидива боли
- г. повышения давления

82. ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ВНУТРИВЕННО ВВОДЯТ

- а. 40% раствор глюкозы
- б. 5% раствор глюкозы
- в. 0,9% раствор натрия хлорида
- г. 40 мг фуросемида

83. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. нейротропных препаратов
- б. аминокaproновой кислоты
- в. диуретиков
- г. дезинтоксикационных растворов

84. ТАКТИКА КУПИРОВАНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА У РЕБЕНКА ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. адреналина, преднизолона
- б. папаверина, дибазола
- в. лазикса, сульфата магния
- г. эуфиллина, эфедрина

85. ПРИСТУПЫ БРОНХОСПАЗМА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- а. пропранолол
- б. симвастатин
- в. ацетилсалициловая кислота
- г. каптоприл

86. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ БРАДИАРИТМИЧЕСКОМ ОБМОРОКЕ (АВ-БЛОКАДА) ВКЛЮЧАЕТ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ

- а. адреналин
- б. лидокаин
- в. кордарон
- г. атропина сульфат

87. ТАКТИКА КУПИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. психостимуляторов
- б. ноотропов
- в. транквилизаторов
- г. нейролептиков

88. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ КУПИРОВАНИИ ОТЕКА ЛЕГКИХ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ, ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. нитропрепаратов
- б. строфантина
- в. магния сульфата
- г. клофелина

89. ТАКТИКА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. унитиола
- б. налоксона
- в. лазикса
- г. манинила

90. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ ВКЛЮЧАЕТ

- а. введение глюкокортикоидных препаратов
- б. введение антибактериальных препаратов
- в. введение транквилизаторов
- г. ингаляции физиологического раствора

91. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ТЕРАПИИ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. нитратов и глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии
- б. сердечных гликозидов и глюкокортикоидов на фоне инфузии поляризующей смеси, ингаляции кислорода
- в. норадреналина и мочегонных препаратов
- г. дофамина, нитратов на фоне поддерживающей инфузионной терапии, ингаляции кислорода

92. ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

- а. аллохола
- б. инсулина
- в. креона
- г. метформина

93. ОСТРАЯ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОТМЕНЕ

- а. ферментных препаратов
- б. ингибиторов протонной помпы
- в. глюкокортикоидных препаратов
- г. мочегонных препаратов

94. ПРИ ИСТИННОМ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- а. адреналин
- б. допамин
- в. мезатон
- г. норадреналин

95. РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ УШЕЙ ПАЦИЕНТОВ

- а. 3% перекись водорода
- б. 5% гидрокарбонат кальция
- в. 5% раствор перманганата калия
- г. 0,05% раствор перманганата калия

96. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРИСТУПА ЭПИЛЕПСИИ

- а. диазепам
- б. лидокаин
- в. кеторолак
- г. клофелин

97. НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. панангина
- б. кальция хлорида
- в. глюкокортикоидных препаратов
- г. кордиамина

98. ВИКАСОЛ НАЧИНАЕТ ПРОЯВЛЯТЬ СВОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ

- а. 12-18 часов
- б. 3-4 часа
- в. 1 час
- г. 30 минут

99. БЫСТРОЕ ВВЕДЕНИЕ ЭУФИЛЛИНА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- а. тахикардию
- б. диарею
- в. брадикардию
- г. запор

100. ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОТЕКА ЛЕГКИХ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ, ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

- а. нитро мак ретард
- б. магния сульфат
- в. клофелин
- г. строфантин

101. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СУДОРОЖНОГО ПРИПАДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- а. дигоксин
- б. дроперидол
- в. димедрол
- г. диазепам

102. ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ВНУТРИВЕННО ВВЕСТИ

- а. глюкокортикоидные препараты
- б. супрастин
- в. кордиамин
- г. адреналин

103. АМИНАЗИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ КУПИРОВАНИИ

- а. истерического припадка
- б. реактивной депрессии
- в. реактивного ступора
- г. реактивного возбуждения

104. ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ЗАПОРОМ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

- а. креон
- б. дюфалак
- в. но-шпу
- г. маалокс

105. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- а. прозерин

- б. налоксон
- в. атропин
- г. кордиамин

106. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- а. клопидогрель
- б. валидол
- в. милдронат
- г. коринфар

107. ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ВОКРУГ СВИЩА ИСПОЛЬЗУЮТ

- а. 3% раствор перекиси водорода
- б. формалин
- в. цинковую пасту
- г. левомеколь

108. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. дибазол
- б. фуросемид
- в. гипотиазид
- г. каптоприл

109. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВНУТРИВЕННО ВВОДИТСЯ

- а. 40 мл 40% раствора глюкозы вместе с 6-8 ЕД инсулина
- б. налоксон
- в. 200 мл 5% раствора глюкозы со скоростью 60 капель в минуту
- г. 40-100 мл 40% раствора глюкозы

110. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЮТ

- а. нитропрепараты
- б. анальгин
- в. пропранолол
- г. морфин

111. АНТИДОТОМ В "ТОКСИЧЕСКОЙ" ФАЗЕ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. атропин
- б. прозерин
- в. бемегрид
- г. налорфин

112. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- а. промедол
- б. морфин
- в. кеторол
- г. омнопон

113. ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

- а. 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- б. камфорным спиртом
- в. 5% спиртовым раствором йода
- г. 2% раствором перекиси водорода

114. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ

- а. сальбутамол
- б. пропранолол
- в. бисопролол
- г. метопролол

115. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- а. морфин
- б. фенobarбитал
- в. раствор аммиака
- г. налоксон

116. К ПРЕПАРАТАМ ПЛАЗМЫ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ

- а. протеин
- б. альбумин
- в. фибриноген, тромбин
- г. иммуноглобулин человека, иммуноглобулин антистафилококковый человека

117. СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА

- а. парацетамол
- б. кофеин
- в. ксенон
- г. эфедрин

118. ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ

- а. галоперидол
- б. флуоксетин
- в. хлорпромазин (аминазин)
- г. парацетамол

119. СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО

- а. налоксон
- б. нитразепам
- в. ибупрофен
- г. пирacetам

120. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

- а. diaзепам
- б. налоксон
- в. афобазол
- г. феназепам

121. ПИРАЦЕТАМ

- а. антибиотик
- б. антисептик
- в. ноотроп
- г. местный анестетик

122. ПРОКАИН (НОВОКАИН) ОТНОСИТСЯ К

- а. гемостатикам
- б. нейролептикам
- в. анальгетикам
- г. местным анестетикам

123. ВАЛОКОРДИН

- а. антибиотик

- б. антисептик
- в. седативное средство
- г. местный анестетик

124. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- а. большая точность дозировки
- б. быстрота действия и частичная инаktivация лекарства в печени
- в. простота в применении и возможность применения в любых условиях
- г. быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт

125. КОФЕИН

- а. антисептик
- б. психостимулятор
- в. местный анестетик
- г. антибиотик

126. ЛИДОКАИН

- а. нейролептик
- б. анксиолитик
- в. анальгетик
- г. местный анестетик

127. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОТЕКА МОЗГА ПРИ РОДОВЫХ ТРАВМАХ ЦНС ИСПОЛЬЗУЮТ

- а. фуросемид
- б. преднизолон
- в. гепарин
- г. полиглюкин

128. ПУПОЧНУЮ РАНКУ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ГНОЙНОГО ОТДЕЛЯЕМОГО ОБРАБАТЫВАЮТ РАСТВОРОМ

- а. 0,9% хлорида натрия
- б. 1% перманганата калия
- в. 5% спиртовым раствором йода
- г. 3% перекиси водорода

129. ДЕТАМ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРИ АНЕМИЯХ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ НАЗНАЧАЮТ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ

- а. драже (ферроплекс)
- б. сироп (актиферрин)
- в. ампулы для инъекций (феррум-лек)
- г. капсулы (эрифер)

130. СОЕДИНЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ БАЛАНС МИКРОФЛОРЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

- а. антибиотики
- б. пищевые добавки
- в. соли кальция
- г. раствор эуфиллина

131. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИМЕНЯЮТ

- а. мерказолил
- б. тиреотом
- в. L-тироксин
- г. метформин

132. ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ ПРИМЕНЯЮТ

- а. но-шпа, папаверин
- б. изосорбид-5-мононитрат, метопролол

- в. аспирин, преднизолон
- г. аспаркам, панангин

133. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- а. кислотами и щелочами
- б. опиатами
- в. амитриптилином
- г. барбитуратами

134. НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- а. панангина
- б. кордиамина
- в. кальция хлорида
- г. глюкокортикоидных препаратов

135. ГОРМОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

- а. беклометазон
- б. атровент
- в. беродуал
- г. сальбутамол

136. УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИЛИ УСТРАНЯЮЩИЕ ОЩУЩЕНИЕ СТРАХА, ТРЕВОГИ, ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ

- а. нейролептики
- б. транквилизаторы
- в. седативные
- г. ноотропные

137. ВЫСОКОАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА С ХАРАКТЕРНЫМ АНТИПСИХОТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ (СНИМАЮТ БРЕД, ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ПСИХОМОТОРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ)

- а. нейролептики
- б. транквилизаторы
- в. седативные средства
- г. психостимуляторы

138. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕЙРОЛЕПТИКОВ

- а. депрессия
- б. невроз
- в. астения
- г. рвота центрального характера

139. К СЕДАТИВНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТ

- а. галоперидол, дроперидол
- б. препараты брома, валерианы, пустырника
- в. фенobarбитал, барбамил
- г. сиднокарб, мезокарб

140. ПРЕПАРАТЫ ВАЛЕРИАНЫ ПРИМЕНЯЮТ

- а. при астении
- б. при депрессивных состояниях
- в. при гипертонических кризах
- г. при неврозах, раздражительности, истериях

141. НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ

- а. для временной стимуляции работоспособности
- б. для лечения детей с отставанием в умственном развитии

- в. для стимуляции дыхания
- г. для повышения устойчивости организма к инфекциям

142. ФЛУМАЗЕНИЛ ВВОДЯТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- а. диазепамом
- б. амфетамином
- в. мезокарбом
- г. флуоксетином

143. К ПСИХОСТИМУЛЯТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- а. ноотропил, кавинтон, пикамилон
- б. флуоксетин, амитриптилин, ниапамид
- в. мезокарб, меридил, кофеин
- г. диазепам, оксазепам, нитразепам

144. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЮТ В РАСТВОРЫ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ?

- а. эпинефрин
- б. норэпинефрин
- в. спирт этиловый
- г. атропин

145. ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АНЕСТЕЗИИ

- а. лидокаин
- б. бензокаин
- в. артикаин
- г. тетракаин

146. ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ -

- а. заместительная
- б. симптоматическая
- в. этиотропная
- г. патогенетическая

147. К ГРУППЕ АДсорбирующих средств относится

- а. лигнин
- б. лидокаин
- в. висмута субнитрат
- г. капсаицин

148. К кардиотоническим средствам относится

- а. молсидомин
- б. нитроглицерин
- в. добутамин
- г. прокаинамид

149. кальций хлорид вводится только

- а. внутривенно
- б. ингаляционно
- в. внутримышечно
- г. подкожно

150. препарат, обладающий способностью растворять свежесформировавшиеся тромбы

- а. фенилин
- б. коринфар
- в. стрептокиназа
- г. неодикумарин

151. МУКОЛИТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- а. мукалтин
- б. ацетилцистеин
- в. натрия гидрокарбонат
- г. настой травы термопсиса

152. ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- а. препараты алтея, термопсиса
- б. ацетилцистеин
- в. бутамират
- г. натрия гидрокарбонат

153. СТИМУЛИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЧИ

- а. аллохол
- б. атропина сульфат
- в. дротаверин
- г. магния сульфат

154. К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- а. лансопразол
- б. фамотидин
- в. флуоксетин
- г. магния трисиликат

155. К ПРЕПАРАТАМ, ПОКРЫВАЮЩИМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ЯЗВЕННЫЙ ДЕФЕКТ И СПОСОБСТВУЮЩИМ ЗАЖИВЛЕНИЮ ЯЗВЫ ОТНОСЯТ

- а. висмута трикалия дицитрат
- б. омепразол
- в. мизопростол
- г. вазелиновое масло

156. ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОРВОТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И СПОСОБСТВУЕТ ЭВАКУАЦИИ ПИЩИ ИЗ ЖЕЛУДКА В КИШЕЧНИК

- а. скополамин
- б. метоклопрамид
- в. мизопростол
- г. прометазин

157. ПРИ ВВЕДЕНИИ АТРОПИНА НАБЛЮДАЕТСЯ

- а. сужение зрачка
- б. бронхоспазм
- в. тахикардия
- г. снижение артериального давления

158. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ ПРИМЕНЯЮТ

- а. пилокарпин
- б. атропин
- в. лобелин
- г. галантамин

159. АТРОПИН ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ

- а. язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- б. глаукоме
- в. бронхиальной астме
- г. атриовентрикулярном блоке

160. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГНОЙНЫХ РАН МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- а. перекись водорода
- б. раствор аммиака
- в. этиловый спирт
- г. деготь березовый

161. ФУРАЦИЛИН ПРИМЕНЯЮТ

- а. для обеззараживания инструментов, помещений и выделений больных
- б. для обработки операционного поля
- в. для уничтожения возбудителей на слизистых рта и горла
- г. для дезинфекции инструментов

162. ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- а. для профилактики заболеваний, передающихся половым путем
- б. для консервации анатомических препаратов
- в. для компрессов
- г. для промывания желудка при отравлениях

163. ДОЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

- а. минимальная
- б. средняя терапевтическая
- в. токсическая
- г. летальная

164. ОСЛАБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- а. пристрастие
- б. синергизм
- в. привыкание
- г. антагонизм

**Задания практического характера по ОП. 05 Фармакология
(Комплексный экзамен)**

Вариант 1.

1. Выписать рецепт на 10 ампул по 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата (*Atropini sulfas*). Назначить для подкожного введения по 1 мл 2 раза в сутки.
2. Выписать рецепт на 10 капсул по 50 мг триамтерена (*Triamterenum*). Назначить по 1 капсуле 2 раза в день.
3. Выписать рецепт на 10 ректальных свечей по 0,005 диазепама (*Diazepamum*). Назначить по 1 свече в прямую кишку 1 раз в сутки.
4. Выписать рецепт на 3 таблетки по 500 мг азитромицина (*Azithromycinum*). Назначить по 1 таблетке 1 раз в сутки.
5. Выписать рецепт на 20 г мази, содержащей 6% салициловой кислоты (*Acidum salicylicum*). Для смазывания пораженных участков кожи.

**Эталоны ответов на тестовые задания по
ОП.05 Фармакология**

1	в	83	а
2	а	84	а
3	а	85	а
4	г	86	г
5	в	87	г
6	а	88	а
7	в	89	а
8	а	90	а
9	б	91	г
10	а	92	г
11	в	93	в
12	б	94	б
13	б	95	а
14	в	96	а
15	в	97	в
16	а	98	а
17	г	99	а
18	а	100	а
19	б	101	г
20	б	102	г
21	в	103	г
22	а	104	б
23	б	105	б
24	б	106	а
25	а	107	в
26	а	108	г
27	г	109	г
28	г	110	а
29	а	111	а
30	а	112	б
31	а	113	а
32	б	114	а
33	а	115	в
34	а	116	в
35	в	117	в
36	а	118	г
37	в	119	б
38	а	120	б
39	г	121	в
40	г	122	г
41	в	123	в
42	б	124	в
43	б	125	б
44	а	126	г
45	а	127	а
46	а	128	г
47	б	129	б
48	в	130	а

49	г	131	г
50	а	132	б
51	б	133	а
52	а	134	г
53	а	135	а
54	г	136	б
55	г	137	а
56	в	138	г
57	а	139	б
58	б	140	г
59	г	141	б
60	а	142	а
61	б	143	в
62	а	144	а
63	а	145	а
64	а	146	б
65	б	147	а
66	б	148	в
67	г	149	а
68	г	150	в
69	г	151	б
70	в	152	в
71	б	153	а
72	а	154	г
73	а	155	а
74	в	156	б
75	в	157	в
76	в	158	а
77	б	159	б
78	а	160	а
79	а	161	в
80	а	162	а
81	в	163	б
82	а	164	в

**Эталоны ответов на задания практического характера по
ОП.05 Фармакология**

Вариант 1.

1. Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% - 1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Для подкожного введения по 1 мл 2 раза в сутки.
2. Rp.: Caps. Triamtereni 0,05
D.t.d. N. 10
S. По 1 капсуле 2 раза в день.

seu
Rp.: Triamtereni 0,05
D.t.d. N. 10 in caps.
S. По 1 капсуле 2 раза в день.
3. Rp.: Supp. cum Diazepamо 0,005
D.t.d. N. 10
S. По 1 свече в прямую кишку 1 раз в сутки на ночь.
4. Rp.: Tab. Azithromycini 0,5
D.t.d. N. 3
S. По 1 таблетке 1 раз в сутки.

seu
Rp.: Azithromycini 0,5
D.t.d. N. 3 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в сутки.
5. Rp.: Ung. Acidi salicylici 6% – 20,0
D.S. Для смазывания пораженных участков кожи.